

当院循環器内科との共同研究

■ 歯周病検査

冠動脈疾患の程度を知らない歯科医が、パノラマX線写真による評価を含めて歯周病の評価を行った（右シート参照）。

歯周病検査における評価項目

- プロービング時の出血率（%）
- 最深部が6mm以上の歯周ポケットを有する歯数
- 喪失歯数
- 歯根長の 1/2 以上の骨吸収 を有する歯の割合（%）
- 喫煙程度

歯周病評価シート

患者登録番号:

診察年月日:

患者氏名:

年齢:

生年月日:

原疾患名:

人工弁: あり・なし

細菌性心内膜炎の既往: あり・なし

カルシウム拮抗剤の内服: あり・なし

服用期間:

ワーファリン内服: あり・なし

服用期間:

PT-INR:

<全身的評価>

糖尿病: あり・なし

HbA1c:

その他の指標:

喫煙: あり・なし

喫煙年数:

1日の喫煙本数:

本/日

身長: m

体重: kg

体格指数((BMI: body-mass index)) = (体重(kg)/身長(m)²) =

<口腔内評価>

ブラークチャート	X								X							
線腫、その他																
歯の動揺度																
ポケット最深部の深さ																
上顎	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
下顎	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
ポケット最深部の深さ																
歯の動揺度																
線腫、その他																
ブラークチャート	X								X							

残存歯数: 本

PCR: (ブラークの付着している歯面数の合計/被検歯面数の合計) × 100 = %

動揺歯数(2度以上): 本(%)

プロービング時の出血した部位数: 本(%)

ポケット 6 mm 以上の歯数: 本(%)

骨吸収が歯根長の 1/2 以上におよぶ本数: 本(%)・・・パントモで評価

歯周病の程度: 健康 歯肉炎 軽度歯周炎 中等度歯周炎 重度歯周炎

コメント: