

嚥下障害評価

基本情報

- 栄養摂取方法  経口摂取  経鼻経管栄養  胃瘻  IVH  その他
- 移動手段  自立歩行  杖歩行  車椅子  ストレッチャー  その他
- 気管切開  なし  あり (  カフ付  カフなし  スピーチ  レティナ )

食事に関する情報(経口摂取している場合)

- 食事内容  普通食  お粥  ぎざみ  ミキサー  その他
- 食事中的ムセ  なし  あり  
 ムセるもの  水分  固形物  その他  
 ムセの頻度  毎食  1日数回  週に数回
- 食事時間  ~30分  30分~45分  45分~1時間  1時間以上
- 摂取量  全量  1/2以上  1/2程度  1/2以下
- 食べこぼし  なし  あり
- 流涎  なし  あり
- 食事姿勢  座位  半座位  ベッド上

耳鼻所見

- 湿性嗅声  なし  あり
- 嗅声  なし  あり
- 閉鼻声  なし  あり
- 構音障害  なし  あり

口腔内所見

- 口腔内唾液貯留  なし  あり
- 舌萎縮  なし  あり
- 舌前方突出時の偏位  なし  あり
- 舌の不随意運動  なし  あり
- 軟口蓋の挙上  良好  不良
- 咽頭反射  良好  強い  消失

ファイバー所見

- 喉頭蓋谷-下咽頭の貯留物  なし  あり
- 喉頭の知覚(反射)  あり  低下
- 声帯の可動性  良好  不良
- ビオクタニン水嚥下  
 (実施した場合に記載)
- 咽頭流入  なし  あり
- 喉頭侵入  なし  あり
- 梨状窩貯留  なし  あり
- 誤嚥  なし  あり