

嚥下障害評価表

● 基本情報

- 栄養摂取方法 経口摂取 経鼻経管栄養 胃瘻 IVH その他
- 移動手段 自立歩行 杖歩行 車椅子 ストレッチャー その他
- 気管切開 なし あり (カフ付 カフなし スピーチ レティナ)

食事についての問診(経口摂取している場合)

- 食事内容 普通食 お粥 きざみ ミキサー その他
- 食事中のムセ なし あり ムセるもの 水分 固形物 その他
ムセの頻度 毎食 1日数回 週に数回
- 食事時間 ~30分 30分~45分 45分~1時間 1時間以上
- 摂取量 全量 1/2以上 1/2程度 1/2以下
- 食べこぼし なし あり
- 流涎 なし あり
- 食事姿勢 座位 半座位 ベッド上

音声所見

- 湿性嚔声 なし あり
- 嚔声 なし あり
- 開鼻声 なし あり
- 構音障害 なし あり

口腔内所見

- 口腔内唾液貯留 なし あり
- 舌萎縮 なし あり
- 舌前方突出時の偏位 なし あり
- 舌の不随意運動 なし あり
- 軟口蓋の挙上 良好 不良
- 咽頭反射 良好 弱い 消失

ファイバー所見

- 喉頭蓋谷・下咽頭の貯留物 なし あり
- 喉頭の知覚(反射) あり 低下
- 声帯の可動性 良好 不良
- ピオクタニン水嚥下 咽頭流入 なし あり
- (実施した場合に記載) 喉頭侵入 なし あり
- 梨状窩貯留 なし あり
- 誤嚥 なし あり