

# 3カ月後経口摂取と背景因子

	経口摂取(N = 141)		非経口摂取(N = 371)		p
年齢 (中央値, 四分位)	78	(71-85)	83	(77-87)	<0.001
≤80歳	79	(57%)	130	(35%)	<0.001
男性	77	(56%)	168	(45%)	0.059
高血圧	90	(65%)	268	(72%)	0.064
糖尿病	31	(23%)	86	(23%)	0.774
脂質異常症	16	(12%)	65	(18%)	0.087
喫煙	18	(13%)	42	(11%)	0.650
心房細動	54	(39%)	198	(53%)	0.002
脳卒中の既往	42	(30%)	116	(31%)	0.587
虚血性心疾患	19	(14%)	50	(14%)	0.999
発症前mRS スコア, 中央値 四分位)	0	(0-2)	1	(0-3)	<0.001
発症前mRS スコア 0	81	(59%)	158	(43%)	0.001
入院時NIHSS, 中央値 (四分位)	16	(10-23)	22	(13-28)	<0.001
入院時NIHSSスコア ≤17	74	(54%)	119	(32%)	<0.001
Day10 NIHSSスコア, 中央値 (四分位)	13	(7-20)	22	(15-29)	<0.001
Day 10 NIHSSスコア ≤17	91	(66%)	122	(33%)	<0.001