

# シェーグレン症候群患者さんの治療に用いられる主な薬剤

※1シェーグレン症候群の病態を有していない薬剤を含んでいます。  
 ※2「効用・効果」、「用法・用量」、「使用上の注意」等は、各製品の添付文書をご確認ください。

ドライマウス

## ムスカリン受容体拮抗薬

### サラジエン® (ピロメリン塩化物)



サラジエン眼薬0.5%  
 【用法・用量】  
 ・1回1滴、1日3回 点眼  
 【効用・効果】  
 ・眼瞼の乾燥状態を改善し、涙の分泌を促進する。  
 ・シェーグレン症候群患者の口腔乾燥症状の改善



サラジエン眼薬0.5%  
 【用法・用量】  
 ・1回1滴、1日3回 点眼

### エボザック® (ピロメリン塩化物)



エボザック軟膏0.330%  
 【用法・用量】  
 ・1回1回塗り、1日3回 点眼  
 【効用・効果】  
 ・シェーグレン症候群患者の口腔乾燥症状の改善

### サリグレン® (ピロメリン塩化物)



サリグレン軟膏0.330%  
 【用法・用量】  
 ・1回1回塗り、1日3回 点眼

## 人工唾液

### サリベート®



サリベートエアゾール  
 【用法・用量】  
 ・1回1〜2回噴霧、1日4〜5回  
 【効用・効果】  
 ・口腔乾燥、口内炎、口内炎の予防、シェーグレン症候群による口腔乾燥、乾燥症の改善、口内炎の予防、口内炎の改善

## 点眼薬※1

### ピソルボン® (プロメトリン塩化物)



ピソルボン眼薬0.4%  
 【用法・用量】  
 ・1回1回、1日3回 点眼  
 【効用・効果】  
 ・下眼瞼の充血、眼瞼の乾燥、眼瞼の腫れ、眼瞼の紅腫、眼瞼の腫れ

## 漢方薬※1

### 麦門冬湯



麦門冬湯眼薬エキス錠剤 (漢方薬)  
 【用法・用量】  
 ・1回1錠、1日3回 点眼  
 【効用・効果】  
 ・目の乾燥、目の充血、目の腫れ、目の紅腫、目の腫れ

## 含嗽剤

### インザン® ガーグル液7% (オキシテトラヒドロリン酸ナトリウム)



インザン® ガーグル液7%  
 【用法・用量】  
 ・1回15〜20秒含嗽、1日3回含嗽  
 【効用・効果】  
 ・咽痛、口内炎、口内炎の予防、口内炎の改善、口内炎の腫れ、口内炎の紅腫、口内炎の腫れ

### 含嗽用ハチアズレ® (アズルピリン)



含嗽用ハチアズレ®  
 【用法・用量】  
 ・1回1〜2回含嗽、1日3回含嗽  
 【効用・効果】  
 ・咽痛、口内炎、口内炎の予防、口内炎の改善、口内炎の腫れ、口内炎の紅腫、口内炎の腫れ

## その他：口腔ケア製品、シュガーレスガム等

### ウェットケアプラス®



（医薬部外品）