

薬効群：骨粗鬆症治療目的のビスホスホネート製剤（経口薬）

推奨薬リスト

推奨度	一般名	剤型	商品名	採用区分	備考
第一推奨	アレンドロン酸ナトリウム水和物	錠剤	アレンドロン酸錠「トーワ」35mg	院内・院外	週1回
第二推奨	アレンドロン酸ナトリウム水和物	錠剤	アレンドロン酸錠「トーワ」5mg	院外	連日
	リセドロン酸ナトリウム水和物	錠剤	リセドロン酸Na錠「トーワ」2.5mg	院内・院外	連日
		錠剤	ベネット錠75mg	院外	月1回

<添付文書に関連する注意事項>

【立位・座位保持不可患者への注意】

- 坐位を30分以上保てない患者には禁忌（推奨しない）

【腎障害患者に関連する注意】

- アレンドロン酸ナトリウム水和物：重篤な腎機能障害患者への安全性未確立
- リセドロン酸ナトリウム水和物：高度腎障害患者（CCr 約30mL/分未満）では禁忌

【妊産婦に関連する注意】

- アレンドロン酸ナトリウム水和物：安全性未確立のため有益性投与
- リセドロン酸ナトリウム水和物：禁忌

【小児等に関連する注意】

- アレンドロン酸ナトリウム水和物：小児等に対する安全性未確立
- リセドロン酸ナトリウム水和物：低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性未確立