

薬効群：成人におけるアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）（高血圧症）

#### 推奨薬リスト

推奨	第一推奨薬	
一般名	オルメサルタン メドキシミル	アジルサルタン
商品名	<b>オルメサルタン錠 20mg</b>	<b>アジルサルタン錠 20mg</b>
用法	1日1回 経口投与	1日1回 経口投与
用量	1回 10～20mg（最大 40mg）	1回 20mg（最大 40mg）

#### 添付文書に関連する注意事項

##### 妊産婦に関連する注意

- オルメサルタン錠、アジルサルタン錠は妊婦に禁忌。
- オルメサルタン錠、アジルサルタン錠を内服中には授乳しないことが望ましい。

##### 小児等に関連する注意

- オルメサルタン錠、アジルサルタン錠は小児を対象とした臨床試験を実施していない。

#### 推奨薬以外の ARB について

- 高尿酸血症合併高血圧に対してはロサルタン錠が適している。
- ロサルタン錠は「高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症」の適応が承認されている。
- カンデサルタン錠は「慢性心不全」、「腎実質性高血圧症」の適応が承認されている。
- カンデサルタン錠は1歳以上の小児に、バルサルタン錠は6歳以上の小児に適応が承認されている。